



Türk Kulak Burun Boğaz ve
Baş Boyun Cerrahisi Vakfı



4. İlkbahar Toplantısı

18-21 Nisan 2019

Maxx Royal Belek, Antalya

KONGRE KİTABI

www.tkbbvbahar2019.org



KONGRE ORGANİZASYON KOMİTESİ

Prof. Dr. Ümit Uluöz
TKBBV 4. İlkbahar
Toplantısı Kongre Başkanı

Doç. Dr. İbrahim Sayın
Genç KBB İlkbahar
Toplantısı Başkanı

Doç. Dr. Kerem Öztürk
Kongre Sekreteri

TKBBV YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Murat Toprak
Başkan

Prof. Dr. Fatih Öktem
Başkan Yardımcısı

ÜYELER

Prof. Dr. Ferhan Öz
Prof. Dr. Ümit Uluöz
Prof. Dr. Asım Kaytaz
Prof. Dr. Tefvik Aktürk
Doç. Dr. Orhan Yılmaz
Uzm. Dr. Ayhan Gökler

TKBBV KURUCULAR KURULU

A Okan Gürsel
Ahmet Almaç
Ahmet Dündar
Alpaslan Akmandil
Aras Şenvar
Asım Kaytaz
Ayhan Gökler
Barlas Aydoğan
Bülent Gürsel
Can Özşahinoğlu
Cavit Özeri
Cengiz Bora Yağız
Çetin Çuhruk
Ergin Turan
Fatih Bora
Fatih Öktem
Ferhan Öz
Gündüz Kumbasar
Günter Hafız
Halis Ünlü
Hasan Candan
Hüsnü Özek

İ. Nazmi Hoşal
İbrahim Sayın
İrfan Devranoğlu
İsmail Topçu
Kerim Ceryan
Levent N. Özlüoğlu
Levent Soylu
M. Ali Şehitoğlu
M. Çağatay Akçalı
M. Fazıl Yazıcı
M. Haluk Bilgin
M. Tahir Altuğ
Mehmet Ada
Mehmet Demirel
Metin N. Akıner
Murat Toprak
Mustafa Çalgüner
Mustafa Gerek
Nazım Korkut
Necdet Biliciler
Necmettin Akyıldız
Nermin Başerer

Nurettin Sözen
Nuri Özgirgin
Oktay Dinç
Orhan Cura
Orhan Yılmaz
Övünç Günhan
Sefa Kaya
Selim Ölçer
Suat Özbilen
Şefik Hoşal
Şeref Ünver
Şinasi Yalçın
Tayfun Kirazlı
Teoman Şeşen
Tevfik Aktürk
Turgay Han
Ümit Uluöz
Vecdet Kayhan
Yalçın Özkaptan
Yılmaz Ege

S-1 Tiroglossal Duktus Kistinde Papiller Tiroid Karsinom Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Nur Yücel Ekici

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Adana, Türkiye

S-2 Supraglottik larenjektomili hastalarda düzeltilmiş cepstral pik nokta analizi

Ziya Saltürk, Onur Üstün, Belgin Tutar, Tolgar Lutfi Kumral, Güler Berkiten, Hüseyin Sarı, Yavuz Uyar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye

S-3 Baş dönmesi değerlendirme envanterlerinin okunabilirlik indekslerinin incelenmesi

Mehmet Eser Sancaktar¹, Mahmut Yıldırım¹, Yusuf Dünder²

1: Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Samsun, Türkiye

2: Rize Devlet Hastanesi KBB Kliniği, Rize, Türkiye

S-4 Septoplasti Ameliyatı Sonrasında Silikon Nazal Tampon uygulamasının Hasta İyileşme Sürecine Etkileri

Oğuzhan Dikici

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Bursa, Türkiye

S-5 Bening Paroksizmal Pozisyonel Vertigo ile D vitamini ilişkisi

Ali Seyed Resuli

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, İstanbul, Türkiye

Bening Paroksizmal Pozisyonel Vertigo ile D vitamini ilişkisi

Ali Seyed Resuli

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bening Paroxysmal Pozisyonel vertigo (BPPV) en sık periferik vertigo nedenidir. Bu çalışmada toplumdaki sosyolojik yapı nedeniyle güneş ışığına karşılaşmanın az olması, sonuç itibarıyla serum D vitamini düzeyinin düşüklüğünün BPPV gelişimine predispozan faktör olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntemler: Bu çalışmada 2010-2018 yılları arasında hastanemize baş dönmesi şikâyetiyle başvuran hastaların nörolojik ve otojik incelemesi sonucu BPPV tanısı konulan hastaların serum D vitamini düzeyleri ölçülmüştür. BPPV tanısı almış hastaların serum D vitamini düzeyleri normal popülasyondakilerle karşılaştırılmıştır. Serum D vitamini düzeyleri Chemiluminescence İmmunoassay (CIA) yöntemi ve Beckman Coulter Access-2 cihazı ile ölçülmüştür.

Bulgular: 285 erişkin hastanın retrospektif olarak teşhisleri ve laboratuvar sonuçları incelenmiştir. BPPV tanısı konulan hastaların ortalama serum D vitamini düzeyleri 15.40 ngr/ml olarak saptandı. Bu değerin normal sağlıklı kontrol grubunun ortalama serum D vitamini (32.20 ngr/ml) düzeyinden anlamlı bir şekilde düşük olduğu tespit edildi.

Sonuç: Bening Paroxysmal Pozisyonel vertigo'da D vitamini eksikliğinin utrikular makuladaki otolitlerin yerlerinden ayrılıp semisirküler kanalların içine kaçması ve endolenf içinde serbest dolaşmasına (kanalolitiasis) veya kupulaya yapışarak (kupulolitiasis) yanlış sinyal oluşumunu kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Yapılan çalışmada BPPV'lu hasta grubunda serum D vitamini düzeylerinin anlamlı bir şekilde düşük olduğu ortaya konulmuştur. BPPV hastalığının tedavisinde ve nükslerinin önlenmesinde D vitamini replasmanı önem taşımaktadır.

Anahtar kelimeler: vertigo, benign paroksizmal pozisyonel vertigo, D vitamini